

INITIATION A L'IVG MEDICAMENTEUSE

1. OBJECTIFS

Cette formation doit permettre aux médecins participants de :

- A. Appréhender le contexte réglementaire de l'IVG médicamenteuse
- B. Apporter écoute et information à la patiente qui demande une IVG
- C. Prendre en charge la patiente pour son IVG : choix de la méthode, orientation selon son âge et l'âge gestationnel
- D. Identifier les suites de l'IVG médicamenteuse normales et pathologiques pour éviter des bilans inutiles et coûteux

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

1. Mettre en œuvre l'éligibilité pour l'IVG médicamenteuse à domicile
2. Orienter les patientes vers les professionnels qui peuvent les prendre en charge
3. Reconnaître les contre-indications de la méthode médicamenteuse
4. Citer les effets secondaires et les échecs de l'IVG médicamenteuse
5. Identifier les suites pathologiques d'une IVG médicamenteuse
6. Prendre en charge la contraception des patientes pour éviter la récurrence des IVG

PROGRAMME DE LA JOURNEE

MATINEE

Objectifs : A B 1 2 3

9 h 00 : Présentation de l'équipe d'intervenants, qui introduit ensuite la formation, son programme et ses objectifs

9 h 15 : Tour de table dirigé par l'animateur : les participants se présentent à leur tour, expriment leurs attentes et leurs motivations à cette formation et leurs difficultés à orienter les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesses

9 h 45 : L'IVG en France : exposé de l'expert en plénière

- Epidémiologie
- Législation
- Stratégies de prise en charge : aspect médico-économique

10 h 00 : Jeux de rôle : patiente ambivalente sur décision à prendre et sur le mode d'IVG

Méthode pédagogique :

- Attribution par l'animateur des rôles sur la base du volontariat
- Déroulement des saynètes
- Débat
- Synthèse par les experts

Suivi d'un débat sur les avantages et les inconvénients des différentes méthodes

11 h 00 : Pause

11 h 15 : Explication de la technique de l'IVG médicamenteuse et modalités pratiques pour faire l'IVG en ville : exposé de l'expert en plénière

11 h 35 : Indications et contre-indications techniques et psychologiques de la méthode en particulier en ville : exposé de l'expert en plénière

11 h 55 : Critères d'évaluation de l'efficacité de la méthode : atelier

Méthodes pédagogiques :

- Travail en sous groupes
- Présentation par les rapporteurs
- Synthèse de l'expert

12 h 45 : Déjeuner

MESSAGES PRINCIPAUX

- Pour une grossesse de moins de 7 SA, l'efficacité des doses réduites du mifepristone à 200 mg (associée à 1mg de gemeprost délivré uniquement à l'hôpital) est identique à celle des plus fortes doses de 600mg (associée à 400 mg de misoprostol ou à 1 mg de géméprost)
- La méthode la plus fiable pour s'assurer que l'IVG médicamenteuse a été efficace est un contrôle biologique et clinique, 2 à 3 semaines suivant la prise médicamenteuse
- Le médecin doit s'assurer qu'en cas d'effets secondaires la patiente puisse se rendre dans un délai de l'ordre d'une heure dans l'établissement signataire de la convention

APRES-MIDI
Objectifs C D 1 4 5 6

14 h 00 : Travail en atelier sur des 2 cas cliniques :

Méthodes pédagogiques :

- Exposé des cas cliniques par l'animateur
- Travail en sous groupes
- Présentation par les rapporteurs
- Synthèse de l'expert

15 h 00 : Suivi des IVG médicamenteuses : exposé de l'expert en plénière

Clinique, écho, BHCG, éventuelles complications

15 h 30 : Spécificité de l'IVG médicamenteuse en ville : exposé de l'expert en plénière

Quand adresser les patientes à un praticien et avec quels documents ? À qui ?

Comment choisir plutôt ville qu'hôpital ou CPEF ?

16 h 00 : Pause

16 h 15 : Contraception post IVG : tour de table mené par l'animateur de l'expérience des participants et synthèse de l'expert

16 h 45 : Synthèse des apports et modifications pour la pratique : Intervenants et participants

17 h 30 : Remise des divers documents prévus par le cahier des charges de l'OGC

MESSAGES PRINCIPAUX

- L'absence de saignement est le signe probable d'un échec (grossesse évolutive ou grossesse arrêtée non expulsée) ; la présence d'un saignement même abondant n'affirme pas le succès de la méthode
- Signes devant faire consulter en urgence : imprégner plus de 2 serviettes hygiéniques maxi en une heure et ceci durant plus de 2 heures - fièvre supérieure à 38°C persistante ou apparaissant plus de 6 à 8 heures après la prise du misoprostol - reprise d'un saignement abondant, même à distance de la prise des médicaments
- Une aspiration chirurgicale sera réalisée à tout moment de la procédure en cas de complications ou à la demande de la patiente