Mme A...
42 ans
a des douleurs pelviennes chroniques mal systématisées.
Elle a un DIU Miréna.
Son généraliste a fait faire une échographie pelvienne qui montre un kyste ovarien de 4 cm au "contenu échogène hétérogène".
Elle va consulter sa gynécologue.
Que faire ?
Nouvelle échographie 3D avec doppler couleur ?
Dosage du CA 125 ?
IRM ?

Collège de Gynécologie CVL

Cystadénocarcinome ovarien







Collège de Gynécologie CVL

Mme F ... 70 ans
vient pour masse pelvienne de 20 cm inexplorable en échographie car trop volumineuse.
L'IRM fait-elle partie du bilan pré-op ?

Collège de Gynécologie CVL



K ovaire atteinte pelvienne diffuse



Collège de Gynécologie CVL





Collège de Gynécologie CVL

Mme G .... 58 ans,
obèse,
ne prenant pas de THM,
a des métrorragies.
L'échographie est diff cile.
La patiente est diff cile à examiner.
L'hystérosonographie a été impossible.
Elle est claustrophobe et allergique à l'iode.
Que fait-on ?
Un TDM sans injection ?
Une biopsie chirurgicale ?
Une IRM ?

Collège de Gynécologie CVL







K endomètre

Collège de Gynécologie CVL

Mme D .... 65 ans, sous THM, a des métrorragies.
L'échographie trouve un endomètre à 10mm d'épaisseur.
Que faire ?
Une hystérosonographie,
une biopsie par hystéroscopie opératoire,
l'arrêt du THM et une surveillance,
une IRM ?

Collège de Gynécologie CVL







Polype endomètre

Collège de Gynécologie CVL

Mme B ... 46 ans a des douleurs chroniques pelviennes.
elle ne prend pas de contraception et ses régles sont très irrégulières.
Son généraliste a fait faire une échographie qui répond utérus globuleux ﬁbromateux et devant l'insistance de la patiente une IRM pelvienne qui répond suspicion d'adénomyose utérine et varices pelviennes.
Que faire ?
Tt médical ?
Où sont passés les ﬁbromes ?
De toute façon ce n'était pas une bonne indication d'iRM et elle va bientôt être ménopausée ?...

Collège de Gynécologie CVL

adénomyose



Collège de Gynécologie CVL

Mme A... 42 ans a des douleurs pelviennes chroniques mal systématisées. Elle a un DIU Miréna.
Son généraliste a fait faire une échographie pelvienne qui montre un kyste ovarien de 4 cm au "contenu échogène hétérogène".
Elle va consulter sa gynécologue.
Que faire ?
Nouvelle échographie 3D avec doppler couleur ?
Dosage du CA 125 ?
IRM ?

Collège de Gynécologie CVL

Kyste dermoîde







Collège de Gynécologie CVL

Mlle C ... 30 ans
sous CO depuis l'âge de 16 ans
a arrêté sa contraception de puis quelques mois
elle a des douleurs menstruelles et ne voit pas arriver la grossesse tant espérée...
l'échographie montre un utérus rétroversé et un kyste hémorragique. l'échographiste demande une IRM complémentaire.
La patiente va voir sa gynécologue, très inquiète.
Que faire ?
la rassurer... Le kyste est probablement un corps jaune kystique et le radiologue veut faire tourner son IRM...
L'inquiéter et lui proposer une consultation au CECOS ?
Refaire l'échographie ?
Prescrire l'IRM tout de même ?

Collège de Gynécologie CVL







Endométriose

Collège de Gynécologie CVL

Mme E ... 38 ans
a eu 2 FIV, plusieurs années de traitement hormonal,
une intervention pour endométriose en 2005.`
Elle se plaint de douleurs persistantes localisées à droite et a eu à plusieurs reprises
des épisodes de cystite à urines claires.
L'échographie est normale.
l'iRM de 2005 ne montrait pas de signes évidents d'endométriose profonde
alors qu'on en a retrouvé lors de la coelioscopie.
La patiente et son médecin sont découragés.
Que faites vous ?
Une nouvelle IRM est-elle vraiment nécessaire ?

Collège de Gynécologie CVL





Collège de Gynécologie CVL

Endométriose profonde

College de Gynécologie CVL



Collège de Gynécologie CVL